



**FOR VETERINARY USE ONLY**  
DIN 00496200

**DESCRIPTION:** Antiseptic Iodine Spray contains an iodine complex which provides the active iodine in a non-staining, non-stinging form upon topical application. The alcohol base aids in producing a quick drying product, which does not delay wound healing.

**INDICATIONS:** As an aid in the treatment and control of bacterial infections of superficial wounds, cuts and abrasions, navel stumps, dockings, and castration wounds. Also for disinfection of skin areas prior to injections or surgical procedures. If redness, irritation, or swelling persists or increases, discontinue use and consult a Veterinarian.

**CONTENTS:**

Povidone Iodine (equivalent to Titratable Iodine 1%) ..... 10%  
Isopropanol 99% ..... 65.0%  
Inert Ingredients ..... q.s.

**DIRECTIONS:** Remove cap from the pump top. Holding the bottle upright and 15 cm from the skin spray a thin film over the affected area by depressing the pump.

**CAUTION:** Contents are flammable. Do not use or store near heat or flame. Keep tightly closed.

**WARNING:** Do not use on deep or puncture wounds or on serious burns. Avoid contact with eyes and mucous membranes.

**NET CONTENTS / CONTENU NET: 500 mL**

**DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.**  
1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1  
[www.domvet.com](http://www.domvet.com) 1-800-465-7122



**POUR USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT**  
DIN 00496200

**DESCRIPTION:** Iode Spray Antiseptique pour les blessures contenant une complex d'iode qui fournit l'iode actif dans un forme qui ne tache pas et n'est pas cuisante pendant l'application. Le base d'alcool aide a faire produire un produit qui sèche vite mais qui ne relenti pas la quérison de la blessure.

**INDICATIONS:** Assiste dans le traitement et la suppression des infections bacterienne, des blessures superficiel, coupures, écorchures, souche ombilic, queue coupées, et blessures de castration. Aussi pour désinfecter la peau avant une injection ou une opération chirurgical. Si la condition continue ou empire, arrêtez l'usage et consultez un vétérinaire.

**CONTIENS:**

Iode Povidone (équivalent à Iode titrable 1%) ..... 10%  
Isopropanol 99% ..... 65.0%  
Inert Ingrédients ..... q.s.

**MODE D'EMPLOI:** Enlevez le bouchon de la bouteille. Tenez la bouteille droite et 15 cm de la peau et appliqué une mince couche sur l'endroit affecté par appuyant la pompe.

**AVERTISSEMENTS:** Les contenants de cette bouteille peuves prendre feu. N'utilisez pas et ne conservez pas près d'une flamme ou la chaleur. Cardez fermé serré.

**MISE EN GARDE:** N'utilisez pas sur des coupoures creuses ou surdes brûlures sérieuses. Évitez contact avec les yeux et membranes mucus.



**DOMINION VETERINARY LABORATORIES LTD.**  
1199 Sanford St., Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1  
[www.domvet.com](http://www.domvet.com) 1-800-465-7122