

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Gluconate de calcium monohydrate 23.963% p/v
 (équivalent à 10.71 g de calcium par 500 ml)

INGRÉDIENTS INACTIFS : acide borique, eau pour injection.

INDICATIONS : À utiliser comme source de calcium pour aider au traitement de l'hypocalcémie chez les bovins, moutons et porcs, tel la fièvre vitulaire chez la vache laitière.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION : Administrer lentement par voie intraveineuse ou sous-cutanée. L'administration par voie intraveineuse est recommandée dans le traitement de cas aigus. Réchauffer la solution à la température du corps avant l'utilisation. La dose devrait être répartie en plusieurs sites lorsqu'utilisée par voie sous-cutanée. Injecter lentement et de manière aseptique. La dose peut être répétée après plusieurs heures au besoin ou selon les recommandations du vétérinaire. Bovins adultes 250 – 500 mL
 Moutons et porcs adultes 50 – 125 mL
 ou selon les recommandations du vétérinaire. Si l'état de l'animal ne s'améliore pas dans les premières 12 – 24 hrs, consulter votre vétérinaire. Monitorer étroitement l'état de l'animal.

PRÉCAUTIONS : Ne contient aucun agent de conservation. Utiliser que si la solution est claire. Jeter la portion non utilisée.

ENTREPOSAGE : Entreposer entre 15°C et 30°C. Éviter le gel. Garder à l'abri de la lumière.

Fabriqué par / Manufactured by : DMVét, Inc,
 127 Rue de la Grande-Coulée, Orford, QC, Canada, J1X 6Z6

CALBORO-23%

INJECTION DE GLUCONATE DE CALCIUM, USP CALCIUM GLUCONATE INJECTION, USP

USAGE VÉTÉRINAIRE SEULEMENT VETERINARY USE ONLY

STÉRILE / STERILE

Solution parentérale traitant la fièvre vitulaire.
 Parenteral solution for the treatment of milk fever.

Net 500 mL



MISES EN GARDE :

Un délai d'attente pour la viande ou une période de retrait pour le lait n'est pas requis quand utilisé selon les directives de l'étiquette.
 Garder hors de la portée des enfants.

WARNINGS:

No meat withdrawal period or milk withholding time is required when used according to the label.
 Keep out of reach of children.

ACTIVE INGREDIENTS:

Calcium gluconate monohydrate 23.963% w/v
 (equivalent to 10.71 g of calcium per 500 mL)

INACTIVE INGREDIENTS: boric acid, water for injection.

INDICATIONS: For use as source of calcium to aid in the treatment of hypocalcemia in cattle, sheep and swine, such as milk fever in the dairy cow.

DOSAGE AND ADMINISTRATION: Administer slowly by intravenous or subcutaneous injection. Intravenous administration is recommended for the treatment of acute conditions. Warm the solution to body temperature prior to use. When administered subcutaneously, the dose should be divided over several sites. Inject slowly and use aseptic technique for administration. Dosage may be repeated after several hours if required or as recommended by a veterinarian.

Adult cattle 250 – 500 mL

Adult sheep and swine 50 – 125 mL

or as recommended by a veterinarian. If there is no noticeable improvement within 12 to 24 hours following treatment, consult your veterinarian. Monitor animal's condition closely.

CAUTIONS: Contains no preservatives. Use only if solution is clear. Discard any unused portion.

STORAGE: Store between 15°C – 30°C. Keep from freezing. Keep away from direct light.

NTI# 18-802

RMS # 92-1061

Lot:

EXP:



DIN 02422271

DMVét