

INDICATIONS: Shin-Band, a rubefacient (counterirritant) liniment, with antiseptic properties, for use in horses, as an aid in the prevention of bucked shins and in the temporary relief of pain and discomfort associated with splints, osslets, big knee swelling, sore tendons, muscular soreness, and soft ankles.

DIRECTIONS:

For the prevention of bucked shin: Paint Shin-Band one half hour before each workout or race. **DO NOT BANDAGE.** Repeat application daily or as recommended by a Veterinarian.

For the relief of temporary pain and discomfort associated with splints, osslets, big knee swelling, sore tendons, muscular soreness and soft ankles: Apply with brush to the affected area. **DO NOT BANDAGE.** Repeat application once or twice daily on each working day or as recommended by a Veterinarian.

CAUTION: For external use only. Apply Shin-Band on a clean leg, from which all other medications have been removed. If condition does not improve after 2 or 3 consecutive applications or if the condition deteriorates, consult a Veterinarian.

ACTIVE INGREDIENTS:

Methyl Salicylate	84.63 mg/ml
Iodine	47.44 mg/ml
Camphor	31.17 mg/ml
Isopropyl Alcohol	564.40 mg/ml
Gum Benzoin	20.46 mg/ml
Potassium Iodide	13.77 mg/ml

Flammable - Store in a cool place.

Dominion Veterinary Laboratories Ltd.
1199 Sanford Street
Winnipeg, Manitoba, Canada R3E 3A1
www.domvet.com 1-800-465-7122
Made in Canada

DIN 00068063

SHIN-BAND®

**For veterinary use only
Pour usage vétérinaire seulement**
**An external aid for the prevention of
bucked shins and for relief of
temporary pain and discomfort
associated with splints, osslets,
big knee swelling, sore tendons,
muscular soreness, and soft ankles.**

**Un produit d'usage externe
pour la prévention de la périostite
du canon et pour le soulagement
symptomatique de la douleur et
du malaise associés aux suros,
osselets, gonflement du genou,
tendons irrités, douleur musculaire
et chevilles endolories.**

Warning: Poison - Keep out of reach of children
Attention : Poison - Garder hors de la portée des enfants

Net 250 mL

INDICATIONS : Shin-Band, un liniment (révulsif) antiseptique, pour usage chez les chevaux pour la prévention de la périostite du canon et pour le soulagement symptomatique de la douleur et du malaise associés aux suros, osselets, gonflement du genou, tendons irrités, douleur musculaire et chevilles endolories.

MODE D'APPLICATION :

Pour la prévention des tumeurs du canon : Appliquer sur le canon une demi-heure avant le travail ou la course. **NE PAS METTRE DE BANDAGES.** Répéter l'application quotidiennement ou selon les directives d'un vétérinaire.

Pour le soulagement de la douleur temporaire et le malaise associés avec les suros, osselets, gonflement du genou, tendons irrités, douleurs musculaires et chevilles endolories : Appliquer avec une brosse sur les parties atteintes. **NE PAS METTRE DE BANDAGES.** Répéter l'application une ou deux fois par jour chaque journée de travail ou selon les directives d'un vétérinaire.

PRÉCAUTIONS : Pour usage externe seulement. Shin-Band doit être appliqué sur une patte propre, de laquelle tout autre médicament soit enlevé. Si la condition persiste après 2 ou 3 applications consécutives ou si la condition empire, consulter un vétérinaire.

INGRÉDIENTS ACTIFS :

Salicylate de méthyle	84.63 mg/ml
Iode	47.44 mg/ml
Camphre	31.17 mg/ml
Alcool isopropylique	564.40 mg/ml
Gomme de benzoïne	20.46 mg/ml
Iode de potassium	13.77 mg/ml

Inflammable - Conserver dans un endroit frais.

